



Comune di  
**CASTIGLION FIORENTINO**



## **BOLLETTINO FITOPATOLOGICO OLIVO**

20 luglio 2021



Per tutta la settimana generalmente sereno o poco nuvoloso con temperature massime che risulteranno anche sopra i 32-33°.

È tuttavia sempre possibile la formazione di nubi temporalesche ad oggi non prevedibili. Per questo è sempre bene controllare il meteo periodicamente anche per regolarsi nell'effettuare eventuali trattamenti.



### **OLIVO**

**FASE FENOLOGICA:** accrescimento frutticini – inizio indurimento nocciolo  
(secondo luoghi e varietà)

#### Mosca delle olive

<b>LOCALITÀ</b>	<b>Catture del 29.06.2021</b>	<b>Catture del 06.07.2021</b>	<b>Catture del 13.07.2021</b>	<b>Catture del 20.07.2021</b>		
<b>MAMMÌ</b>	Zero	Zero	1 – 0	2 – 0		
<b>S. MARGHERITA</b>	Zero	Zero	0 – 0	1 – 2		
<b>PIEVE DI CHIO</b>	Zero	Zero	1 – 0	3 – 1		
<b>COL DI BIDONE</b>	Zero	Zero	0 – 0	1 – 2		

<b>TARAGNANO SANTA CRISTINA</b>	Zero	Zero	0 – 0	0 – 2		
<b>NOCETA</b>	Zero	Zero	0 – 0	2 – 2		
<b>MONTECCHIO LE COMUNANZE</b>	Zero	Zero	0 – 0	1 – 0		
<b>LA NAVE CASTRONCELLO BROLIO</b>	Zero	Zero	0 – 0	0 – 0		
<b>COZZANO ALTO</b>	Zero	Zero	1 – 0	0 – 0		

Anche in questa ultima settimana (colonna evidenziata in giallo) le catture sono a zero o di poche unità. Non sono necessari interventi.

Siamo ancora in una fase fenologica non idonea per la riproduzione della mosca, Si ricorda, infatti, che l'eventuale l'attività di ovideposizione della femmina di *Bractrocera oleae* (mosca dell'olivo) inizia dalla fase fenologica di completo **indurimento del nocciolo**.

Si rammenta che comunque le alte temperature inibiscono sia gli accoppiamenti che lo sviluppo delle eventuali uova.

### Tignola dell'olivo

Installare le trappole. Nel caso della tignola le trappole forniscono indicazioni circa la curva di volo delle generazioni, ma non una stima effettiva della popolazione larvale. Questa dovrà essere valutata in funzione delle infestazioni dello scorso anno (drupe colpite con caratteristica galleria procedente dal peduncolo verso il nocciolo). La soglia di intervento è valutata tramite il riscontro della presenza delle uova sui frutticini e delle prime olive attaccate. In caso di cascola di olive con la sintomatologia descritta contattare i tecnici.

### Cicloconio o Occhio di pavone

I trattamenti a base di rame sono in genere già stati effettuati. Adesso non è necessario intervenire

### Rogna dell'olivo

La malattia è presente in molti areali olivicoli pertanto, si può affermare che il potenziale infettivo sia importante in tutti gli ambienti. I trattamenti a base di rame possiedono un effetto batterio statico quindi, **in concomitanza di grandinate**, è **INDISPENSABILE** effettuare un intervento entro 24-36 ore dall'evento grandinigeno.

Trattamenti eseguiti più tardivamente non sortiscono alcun effetto. Altre strategie di contenimento della malattia nei bollettini autunnali.

---

**PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO**

**TEL. 057565641 UFFICIO AMBIENTE E SVILUPPO TEL. 0575656415**

**O IL TECNICO DELLA COLDIRETTI:**

**MONTESI LUIGI AL 3475560170**